

EXTRAÇÃO DE INCISIVO SUPERIOR LATERAL (103) POR ABSCESSO PERIAPICAL COM FÍSTULA NA GENGIVA: RELATO DE CASO

Jeanine Creusen, Luis Cláudio Barreto, Paulo Zaluski.

jeanine_creusen@hotmail.com

Introdução: A extração de um incisivo permanente de eqüino é um procedimento sensível, especialmente em cavalos jovens, devido ao tamanho e formato curvo da raiz que, juntamente com o ligamento periodontal, contribuem para a firme inserção do dente no alvéolo. **Relato de caso:** Foi realizado exame oral de um eqüino macho, 9 anos, raça lusitano, utilizado em esporte, com histórico de reação à embocadura e vício de morder objetos. No exame foi encontrado abscesso na região periapical do incisivo superior lateral (103-Sistema Triadan modificado) que, ao ser pressionado, drenava pus por fistula na gengiva. A área foi radiografada na posição dorso-ventral com chassi intra-oral para que a raiz do dente pudesse ser observada, sem superposição de imagem. Encontrou-se área de radiopacidade apical à raiz e desorganização da lâmina dura de 103, demonstrando comprometimento desta. Optou-se pela extração deste dente. Após sedação com cloridrato de detomidina (0,02mg/kg/EV), foi realizado bloqueio regional, com 5ml de lidocaína 2% sem vasoconstritor, no nervo infra orbitário acessado pelo forame infra orbitário. Com o elevador de dente de lobo Swartz a gengiva que contorna o dente foi afastada. Para acessar a região apical utilizou-se a alavanca apical, realizando pressão constante de 15 seg em lados alternados para enfraquecimento do ligamento periodontal. Em seguida, adicionou-se movimento de torção e o dente foi então pinçado com o boticão extrator de fragmento e raiz e tracionado até ser removido. No pós cirúrgico foi recomendado limpeza da cavidade oral, diariamente e aplicação de sal fino de cozinha (NaCl) e massagem no local por quinze dias. Indicou-se também a administração de antibiótico e antiinflamatório parenterais por 4 dias. **Discussão:** Em casos de infecção apical a extração do dente acometido é o procedimento mais indicado. O procedimento foi simples e o resultado dentro do esperado. **Conclusão:** A extração do terceiro incisivo maxilar (103) foi realizada sem prejuízos para a mastigação do animal. O proprietário do mesmo deve ser avisado que este deverá ter seus dentes opostos limados uma vez ao ano para não crescerem, uma vez que lhes falta oposição.