

## OBSTRUÇÃO DE ÍLEO EM EQUINOS: RELATO DE CASO

Rodrigo Romero Corrêa; Daniel Luiz Fecho; Pedro Augusto Santos Costa; Emi Maruhashi;

Neimar Vanderlei Roncati

[romero@anhembimorumbi.edu.br](mailto:romero@anhembimorumbi.edu.br)

**Introdução:** A afecção é definida como uma circunstância em que o íleo se torna obstruído por uma massa dentro do lúmen intestinal. Está relacionada aos volumosos com altos valores de lignina servidos aos animais e também as infestações verminóticas por *A. perfoliata*, que causam danos ao tecido intestinal (íleo). O tratamento é feito de forma conservativa, utilizando-se terapia de suporte, analgésicos, fármacos procinéticos e acompanhamento periódico do animal, ou através de procedimento cirúrgico. As taxas de sobrevivência variam entre 50 a 70% para os animais acometidos, de acordo com o tempo da obstrução. **Relato do caso:** No período de dois anos do Hospital Veterinário Anhembi-Morumbi, foram atendidos nove casos de obstrução de íleo, sendo sete machos e duas fêmeas. Dos animais encaminhados para o hospital veterinário que receberam atendimento médico a campo, quatro deles chegaram sem diagnóstico prévio e desidratados. Durante o atendimento clínico hospitalar e diagnóstico da afecção, dois animais que não apresentavam dor e alterações no líquido peritoneal foram tratados clinicamente, e a obstrução desfeita, porém devido a complicações posteriores um dos animais foi a óbito. Os outros sete animais apresentaram dor constante e alterações no líquido peritoneal, sendo encaminhados para a cirurgia. Deste grupo, dois foram eutanasiados durante o procedimento cirúrgico e em cinco a obstrução foi desfeita e o trânsito intestinal restabelecido. No período pós-cirúrgico, um dos cinco animais foi a óbito após ruptura intestinal em área isquêmica. Os outros quatro animais restantes receberam alta. **Discussão e Conclusão:** O tratamento clínico mostrou-se viável nos dois casos em que os animais foram prontamente atendidos e tratados adequadamente. O mesmo não pôde ser observado nos animais atendidos ou tratados tardiamente, recorrendo-se ao procedimento cirúrgico para a desobstrução do íleo.